

ВОТІГА

Післясходовий гербіцид для захисту посівів кукурудзи

- Швидка гербіцидна дія (7-10 день після внесення)
- Підсилюючий ефект двох діючих речовин
- Широкий спектр боротьби з бур'янами (широколисті та однорічні злакові)
- Гарна ефективність на важких бур'янах
- Селективний до всіх видів кукурудзи
- Гнучкий у застосуванні (2-8 листків у культурі)



ВОТІГА

Діюча речовина:
Піридат 300 г/л + Мезотріон 90 г/л

Препаративна форма:
Олійна дисперсія

Норма витрати:
1,0 л/га

Норма робочої рідини:
200-400 л/га

Механізм дії

- **Системно контактний гербіцид:** діюча речовина абсорбується листям
- **Ліпофільні характеристики:** піридат та мезотріон абсорбується дуже швидко, дощ після внесення не зменшує ефективність діючих речовин
- **Симптоми ураження:** негайне припинення росту бур'янів, після чого настає їхнє повне відмирання: листя жовтіє, потім чорніє (процес починається з поверхні листової пластинки)
- **Сприятливі умови:** тепла погода (висока температура й достатня кількість вологи) сприятиме росту бур'янів та ефективності піридату



Підсилюючий ефект + Управління резистентністю



Ботіга 1 л/га



Контроль

Спектр дії

	1 л/га Ботіга	1 л/га Ботіга + 30 г/га нікосульфурону		1 л/га Ботіга	1 л/га Ботіга + 30 г/га нікосульфурону
Амброзія полинолиста	■	■	Мишій сизий	■	■
Вероніка персидська	■	■	Незабудка польова	■	■
Вероніка плющоліста	■	■	Нетреба звичайна	■	■
Вівсюг звичайний	■	■	Осот жовтий городній	■	■
Волошка синя	■	■	Осот рожевий	■	■
Галінсога дрібноквіткова	■	■	Падалиця ріпаку	■	■
Галінсога чотирьохпромінева	■	■	Пальчатка кров'яна	■	■
Гібіскус трійчастий	■	■	Паслін чорний	■	■
Гірчак березкоподібний	■	■	Переліска однорічна	■	■
Гірчак почечуйний	■	■	Підмаренник чіпкий	■	■
Гірчак шорсткий	■	■	Портулак городній	■	■
Грицики звичайні	■	■	Просо звичайне	■	■
Дурман звичайний	■	■	Ромашка лікарська	■	■
Журавець дрібний	■	■	Рутка лікарська	■	■
Зірочник середній	■	■	Спориш звичайний	■	■
Канатник Теофраста	■	■	Талабан польовий	■	■
Курячі очка польові	■	■	Триреберник непахучий	■	■
Лобода біла	■	■	Фіалка польова	■	■
Мак дикий	■	■	Щириця жминдовидна	■	■
Мишій зелений	■	■	Щириця загнута	■	■

■ Дуже чутливі (90-100%), ■ Чутливі (75-89%), ■ Помірно чутливі (51-74%)

Рекомендації щодо використання

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га
Кукурудза	Широколисті та однорічні злакові бур'яни	2-8 листків у культури (ВВСН 12-18), ранні фази розвитку бур'янів	1,0



Belchim Crop Protection
Technologielaan 7,
B-1840 Londerzeel
Tel: + 32 (0)52 30 09 06
Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:
Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93
Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85
Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71

www.belchim.ua