

Proman[®]

*Досходовий системний гербіцид
для захисту посівів соняшнику,
картоплі, сої та кукурудзи*



- Широкий спектр контролю бур'янів, особливо амброзії полинолистої, лободи та гірчаків
- Нефітотоксичний щодо культури (картоплі, соняшника, сої, кукурудзи та інш.)
- Унікальна властивість реактивації
- Без обмежень у сівозміні
- Можливість застосовувати на піщаних ґрунтах



Proman®

Діюча речовина:.....Метобромурон 600 г/л
 Препаративна форма:.....Концентрат суспензії
 Норма витрати:.....1,7-3,3 л/га
 Норма робочої рідини:.....200-400 л/га



Метобромурон поглинається головним чином кореневою системою бур'янів і транслюється ксилемою до листків. Метобромурон порушує процес фотосинтезу.

Діюча речовина зв'язується з певним сайтом у хлоропластах, що призводить до гальмування фотосинтезу. Продукування поживних речовин зупиняється внаслідок утворення високореактивних молекул, які руйнують клітинні мембрани.



Амброзія полинолиста



Лобода біла

Спектр дії

Спектр бур'янів визначено на основі результатів випробувань (на різних культурах, у різних кліматичних зонах, у різні роки)

Широколисті бур'яни	2,0 л	2,5 л	3,0 л
Канатник Теофраста	■	■	■
Щириця звичайна	■	■	■
Амброзія полинолиста	■	■	■
Лутига розлога	■	■	■
Грицики звичайні	■	■	■
Лобода біла	■	■	■
Лобода гібридна	■	■	■
Дурман звичайний	■	■	■
Галінсога дрібноквіткова	■	■	■
Гібіскус трійчастий	■	■	■
Переліска однорічна	■	■	■
Гірчак звичайний (спориш)	■	■	■
Гірчак березкоподібний	■	■	■
Гірчак почечуйний	■	■	■
Портулак городній	■	■	■
Жовтозілля звичайне	■	■	■
Паслін чорний	■	■	■
Чистець польовий	■	■	■

Зірочник середній	■	■	■
Вероніка перська	■	■	■
Нетреба звичайна	■	■	■
Рутка лікарська	■	■	■
Підмаренник чіпкий	■	■	■
Глуха кропива пурпурова	■	■	■
Ромашка лікарська	■	■	■
Гірчиця польова	■	■	■
Осот рожевий	■	■	■
Редька польова	■	■	■
Ріпак, падалиця	■	■	■

Злакові бур'яни	2,0 л	2,5 л	3,0 л
Пальчатка кров'яна	■	■	■
Плоскуха звичайна	■	■	■
Просо	■	■	■
Тонконіг однорічний	■	■	■
Мишій (види)	■	■	■

■ Дуже чутливі (90-100%), ■ Чутливі (75-89%), ■ Помірно чутливі (51-74%), ■ Нечутливі >50 %



Гірчак звичайний



Ромашка лікарська



Тонконіг однорічний

Рекомендації щодо використання

Культура	Спектр дії	Фаза внесення	Норма витрати, л/га	
			Мін	Макс
Соняшник	Однорічні дводольні та деякі злакові бур'яни	До появи сходів культури	1,7	3,3
Картопля			1,7	2,5
Кукурудза				
Соя				



Гірчиця польова



Belchim Crop Protection
 Technologielaan 7,
 B-1840 Londerzeel
 Tel: + 32 (0)52 30 09 06
 Fax: + 32 (0)52 30 11 35

Представники в Україні:
 Тітов Олексій - +380 (50) 383 81 93
 Суріс Олександр - +380 (50) 527 44 85
 Штефан Андрій - +380 (66) 703 57 71

www.belchim.ua